

**ශ්‍රී ලංකාවේ සියදිවි නසාගන්නන්ගේ වයස් කාණ්ඩය හා ඊට පෙළඹන හේතු හඳුනා ගැනීම.**

**එම්. පී. ඩී. සඳුමාලි<sup>1</sup>**

**සංක්ෂේපය**

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පසුගිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ ආකාරයෙන් සිදු වූ සියදිවි නසාගැනීම් රාශියක් වාර්තා වී ඇත. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සමීක්ෂණවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව රටවල් 172ක් අතුරින් ඉහළ සියදිවි නසාගැනීම් අතර හතරවන ස්ථානයේ පවතී. මේ ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වසරකට ජනගහනයෙන් 4000ක් පමණ මෙම තත්වයට මුහුණපාන ලබන බව මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාතික ආයතනයේ ප්‍රධානියා වන ආචාර්ය නීල් ප්‍රනාන්දු විසින් සිදු කළ සම්මන්ත්‍රණයකින් පළ වූ වාර්තාවකට අනුව හෙළි වී ඇත. මේ අනුව සියදිවි හානිකර ගැනීමට කුමන වයස් කාණ්ඩයන් වැඩි වශයෙන් පෙළඹෙන්නේ ද යන ගැටලුව පාදක කරගනිමින් මෙම අධ්‍යයනය සිදු කර ඇත. මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණ වන්නේ, සියදිවි හානිකරගන්නා පුද්ගලයන්ගේ වයස් කාණ්ඩයන් හා ඊට හේතු හඳුනා ගැනීමයි. පර්යේෂණය සඳහා ද්විතියික දත්ත භාවිත කළ අතර ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව, පොලිස් වාර්තා, ජන මාධ්‍ය මගින් දත්ත ලබා ගන්නා ලදී. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණ ක්‍රමය මගින් අනාවරණය වූයේ, 1990 සිට 2011 කාලය තුළ වයස අවුරුදු 15 න් 44 න් අතර පුද්ගලයන් වැඩි වශයෙන් පෙළඹී ඇති බවයි. එමෙන්ම එම කාලය තුළ දී විෂ පානය කිරීමෙන් මියයන පුද්ගලයින්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අවුරුදු 17 න් 25 න් අතර කාන්තාවන් හා අවුරුදු 55 ට වැඩි පුරුෂයන් වේ. එමෙන්ම ගෙල වැළලා ගැනීමෙන් සියදිවි හානිකරගන්නා පුද්ගලයින්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අවුරුදු 17 න් 25 න් අතර කාන්තාවන් හා අවුරුදු 55 ට වැඩි පුරුෂයන් බව අනාවරණය විය. මෙම මරණ සඳහා ලිංගික ප්‍රවණත්වය, අධ්‍යාපන කටයුතු මෙන්ම මානසික පීඩාවන් ද වැඩි වශයෙන් බලපා තිබුණි. මේ ආකාරයෙන් සියදිවි හානිකරගන්නා පුද්ගලයින්ගෙන් 80% ක් පමණ වයස අවුරුදු 17 න් 25 න් හා වයස අවුරුදු 55 ට වැඩි වයස් කාණ්ඩ වලට අයත් වන බව අනාවරණය විය.

**මූලාසනය :** සියදිවි හානිකරගැනීම, වයස් කාණ්ඩය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, විෂ පානය

<sup>1</sup> ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, [dinushasadamali125@gmail.com](mailto:dinushasadamali125@gmail.com)

