

දේශීය වෛද්‍යවේදයේ සඳහන් තැම්බුමක් ප්‍රමුඛ ප්‍රතිකාර පද්ධතියක් වැදගත් සන්නිවේදන සමනය කිරීම සඳහා යෙදීම

දමයන්ති ඩබ්. එම්. ඒ. ¹

¹ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය, 21, ඇල්බට් වන්දවංකය, කොළඹ 07

සංක්ෂිප්තය

ගර්භනී මවකගේ ශරීරයේ ඇතිවන රුධිර රසායනයේ හා හෝමෝන ශ්‍රාවයන්ගේ වෙනස්වීම් හේතුවෙන් පශ්චාත් ප්‍රසව අවධියේදී ඇතැම් මව්වරු ප්‍රධානවම මානසික රෝග තත්ව තුනකට ගොදුරුවීමේ අවධානමක් ඇති අතර, මාතෘ නිල (Maternity Blues), පශ්චාත් ප්‍රසව විශාදය (Postpartum Depression) හා පශ්චාත් ප්‍රසව සයිකෝසියාව (Postpartum Psychosis) යනු එම රෝග තත්වයන් වේ. මෙම රෝග ත්‍රිත්වය දේශීය චිකිත්සාවේ "වැදගත් සන්නිවේදන" ලෙස හඳුන්වන අතර, මාතෘ නිල අවස්ථාව වැදගත් සන්නිවේදන ප්‍රාරම්භක අවස්ථාව ලෙසත් පශ්චාත් ප්‍රසව විශාද අවස්ථාව මධ්‍යතර අවස්ථාව ලෙසත් පශ්චාත් ප්‍රසව සයිකෝසියාව වැදගත් සන්නිවේදන තීව්‍ර අවස්ථාව ලෙසත් හැඳින්විය හැකි ය. මූලික අවස්ථාවලදී නිසියාකාරව රෝග තත්වය හඳුනා නොගැනීමෙන් දරුවා බිහි වී පළමු වසර තුළ පශ්චාත් ප්‍රසව විශාද අවස්ථාව, වැදගත් සන්නිවේදන මධ්‍යතර අවස්ථාව ට පත්වීමේ අවදානම් තත්වයක් ලෙසත් මෙම තත්වය උග්‍ර වී ඇති වන පශ්චාත් ප්‍රසව සයිකෝසියාව, වැදගත් සන්නිවේදන තීව්‍ර අවස්ථාව ලෙසත් අනිවාර්ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍යවන තත්වයක් ලෙස දේශීය වෛද්‍යවරුන් මෙන්ම නූතන මානසික වෛද්‍යවරුන්ගේ ද මතයයි. මන්ද මෙම අවස්ථාවේදී බිලිදාගේ, මවගේ මෙන්ම අන් අයගේ ද ජීවිත හානි වැනි දරුණු තත්වයන් ඇතිවන බැවිනි. පශ්චාත් ප්‍රසව අවධියේ මානසික ගැටලු හෙවත් වැදගත් සන්නිවේදන සඳහා දේශීය ප්‍රතිකාර පන්තියක සාඵලාත්මක සොයා බැලීම සහ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය මගින් පහසුවෙන් සුවකළ හැකි අවධානයට ලක්නොවූ පැතිකඩක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම මෙම පර්යේෂණයේ අරමුණ වූ අතර පාරම්පරික වෛද්‍ය අත්දැකීම් මූලාශ්‍රකොට මෙම පර්යේෂණය සිදුකෙරිණි. වැදගත් සන්නිවේදන අවස්ථාවෙන් පෙලෙන රෝගී මව්වරුන් ලෙස හඳුනාගත් කාන්තාවන් පස් (05) දෙනෙකු මෙම පර්යේෂණය සඳහා සහභාගි කරගත් අතර පාරම්පරික අභ්‍යන්තර ප්‍රතිකාර පන්තියක් සමග උපදේශනය ලබාදෙන ලදී. මෙහිදී ප්‍රතිකාර පන්තිය වශයෙන් රඹුක් බොඩ මුල් කරගත් තැම්බුම, විජයරාජ ගුලිය, මාත්තුපහ ගුලිය හා නවරත්න කල්කය භාවිතාකල අතර උපදේශනය වශයෙන් හේතුවාදී විත්තවේගික ප්‍රතිකාරය, කාල්රොපස් පුද්ගල කේන්ද්‍රීය උපදේශන න්‍යාය, ප්‍රජාතන වර්ෂා ප්‍රතිකාර හා සරල සංයම අභ්‍යාස යොදා ගන්නාලදී. ප්‍රතිකාර ලබා දීමේ කාල සීමාව රෝගියාගේ තත්වය අනුව වෙනස් කරන ලදී. ප්‍රතිකාර ලබාදීමේ දී මාසයක හා මාස තුනක කාලසීමාවකදී එක් රෝගියෙකු බැගින්ම මාස හතරක කාලසීමාවකදී රෝගීන් දෙදෙනෙකුත් මාස හයක කාලසීමාවකදී එක් රෝගියෙකුත් ලෙස සුවය ලැබීය. මේ අනුව රඹුක් බොඩ මුල් කරගත් තැම්බුම සහිත ප්‍රතිකාර පද්ධතිය සහ උපදේශනය පශ්චාත් ප්‍රසව අවධියේ වැදගත් සන්නිවේදන සමනය කිරීමට යෝග්‍ය බවත් මෙමගින් දරුවා බිහිවීමෙන් මවගේ ශරීරයේ ඇතිවන හෝමෝන අසමතුලිතතාව ක්‍රමවත් කළහැකි බවත් නිගමනය කළහැක.

ප්‍රමුඛ පද: වැදගත් සන්නිවේදන, තැම්බුම, දේශීය ප්‍රතිකාර

e-mail: amilavapa@gmail.com